

Корь у детей

Корь – острое высоко контагиозное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и характеризующееся наличием лихорадки, симптомов интоксикации, поражением дыхательных путей, конъюнктивитом, наличием пятнисто-папулезной экзантемы с переходом в пигментацию.

Корь является крайне заразной тяжелой болезнью. В 1980 году, до широкого распространения вакцинации, произошло 2,6 миллиона случаев смерти от кори.


Корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире, несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины.

Не вакцинированные дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболевания корью и развития осложнений, включая смертельный исход. Заразиться корью может любой человек, не имеющий иммунитета — тот, кто не был вакцинирован или тот, кто не выработал иммунитет после вакцинации.

Восприимчивость к кори всеобщая, наиболее высока в детском возрасте от 1 года до 5 лет, в период элиминации кори болеют преимущественно подростки и взрослые. Дети до 3 месяцев, как правило, не заболевают. Заражение корью происходит даже при мимолетном контакте. Вирус с потоком воздуха проникает в помещения через коридоры, лестничные клетки, вентиляционную систему. Инфекция через предметы, третьих лиц не передается вследствие малой устойчивости вируса во внешней среде. Возможен трансплацентарный путь передачи при заболевании женщины в последнем триместре беременности. Индекс контагиозных составляет 100%. Корью болеет только человек.

Лечение кори у детей. Если вы заподозрили у ребенка корь, немедленно уложите его и тут же вызовите врача. Обязательно исключите все контакты с детьми, особенно не привитыми. Можно дать жаропонижающее средство: аспирин, парацетамол. Но ни в коем случае сами не давайте ребенку антибиотики - на вирус кори они не действуют! Антибактериальные препараты может назначить только врач и лишь в случае развития осложнений. Сыпь ничем смазывать не нужно. Больных корью детей лечат дома. Госпитализации подлежат больные осложненной корью. Во время лихорадочного периода рекомендуется постельный режим. Койку ставят головным концом к окну, чтобы свет не попадал в глаза. Ребенку дают большое количество жидкости, фруктовых соков, витамины, при упорном сухом кашле - отхаркивающие средства. Рекомендую к прочтению Псориаз у детей первые признаки заболевания. Надежным методом предупреждения кори является иммунизация живой вакциной против кори. Прививка обеспечивает защитный эффект в течение около 15 лет. Первую вакцинацию проводят детям в возрасте около 1 года, вторую прививку делают детям в возрасте 15-18 месяцев.

Симптомы кори



Сыпь на теле
(начинается с лица
и спускается вниз)

Конъюнктивит

Сыпь
на слизистых
рта и горла

Температура
до 40 °C,
возможна
лихорадка

V1 RU

По данным открытых
источников

Меры профилактики кори

Самая эффективная защита от кори – прививка.

Прививка против кори входит в национальный календарь профилактических прививок согласно Приказ Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н

"Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок".

ГБУЗ «Сахалинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики»

2023

Корь
острая вирусная инфекционная болезнь

источник заражения

больной человек

вirus выделяется при чихании и кашле

симптомы

температура 38-40 градусов

резкая слабость

отсутствие аппетита

сухой кашель, насморк

конъюнктивит

через 2-4 дня после первых симптомов болезни на слизистой оболочке щёк – возникают мелкие беловатые высыпания

но 3-5 день болезни появляется сыпь в виде ярких пятен за ушами и на лбу, на лице, шее, теле и конечностях

самые частые осложнения – воспаление лёгких, носоглотки, тяжёлый отит, конъюнктивит.

Лечение заболевания должно проводиться под медицинским контролем!!!

Надёжным и эффективным методом профилактики кори является вакцинация

The infographic is titled 'Корь' (Measles) and describes it as an acute viral infectious disease. It shows a child with a fever and a rash. A circular icon indicates the 'source of infection' (источник заражения) is a 'sick person' (больной человек) who 'releases the virus during coughing and sneezing' (вирус выделяется при чихании и кашле). Below, under 'symptoms' (симптомы), there are five icons: a thermometer (fever), a person looking sick, a spoon (loss of appetite), a person coughing (dry cough, rhinitis), and a person looking unwell (conjunctivitis). Below these are descriptions: 'fever 38-40 degrees' (температура 38-40 градусов), 'severe weakness' (резкая слабость), 'absence of appetite' (отсутствие аппетита), 'dry cough, rhinitis' (сухой кашель, насморк), and 'conjunctivitis' (конъюнктивит). It also states that 'within 2-4 days after the first symptoms, small white spots appear on the mucous membranes of the cheeks' (через 2-4 дня после первых симптомов болезни на слизистой оболочке щёк – возникают мелкие беловатые высыпания) and that 'within 3-5 days of the illness, a rash appears in the form of bright spots behind the ears and on the forehead, face, neck, body, and limbs' (но 3-5 день болезни появляется сыпь в виде ярких пятен за ушами и на лбу, на лице, шее, теле и конечностях). The final section emphasizes that treatment must be under medical control (Лечение заболевания должно проводиться под медицинским контролем!!!) and that vaccination is the reliable and effective method of prevention (Надёжным и эффективным методом профилактики кори является вакцинация).